

## DIE GATTUNG HEYDERIA (Fr.) Link

Schlüssel von K.Siepe  
aus "AMO II" (1986)

- 1a) Fruchtkörper auf Sklerotien anderer Pilze wachsend ..... 2
- 1b) Fruchtkörper auf Koniferennadeln wachsend. Fertiler Teil kugelig oder zylindrisch, ockerfarben:  
**HEYDERIA ABIETIS** (Fr.) Link ss.lato
- 2a) Fertiler Teil eher kugelig, weißlich-gelblich. Fruchtkörper meist gesellig auf Sklerotien von  
*Sclerotinia trifoliorum* wachsend:  
**HEYDERIA SCLEROTIORUM** (Rostr.) D.Benkert
- 2b) Fertiler Teil eher keulig-zylindrisch, gelb-orange. Fruchtkörper meist einzeln auf Sklerotien von  
*Typhula phacorrhiza* (und anderen *Typhula*-Arten ?) wachsend:  
**HEYDERIA SCLEROTIPUS** (Boud.) D.Benkert

Anm.:Ebenfalls hierher gehören möglicherweise auch **MITRULA SPHAEROCEPHALA** Bresadola, von der Typuslokalität in Südtirol auf *Larix*-Nadeln beschrieben und seither nicht wieder aufgesammelt, und **MITRULA BRASSICAE** Hammarlund, eine schwedische Art, von der meines Wissens ebenfalls keine weiteren Funde bekannt sind.