

DIE ARTEN UM COPRINUS HEMEROBIUS

von Kees Ulje 1986 --- Übersetzung: Dobbitsch

- 1a) Hut mit langen, braunen Haaren (länger als 200 µm):
COPRINUS AURICOMUS Pat.
- 1b) Hutoberfläche kahl 2
- 2a) Keimporus exzentrisch 5
- 2b) Keimporus zentral 3
- 3a) Sporen über 15 µm lang:
COPRINUS MEGASPERMUS P.D.Orton
- 3b) Sporen unter 15 µm lang 4
- 4a) Sporen mehr als 10 µm breit (Fruchtkörper mit gelben Tönen):
COPRINUS NUDICEPS P.D.Orton
- 4b) Sporen schmaler als 10 µm:
COPRINUS HEMEROBIUS Fr.
- 5a) Auf Mist. Hut bis maximal 10 mm Durchmesser. Sporen 8-10,5 x 8-10 µm:
COPRINUS MISER P.Karsten
- 5b) Nicht mit dieser Merkmalskombination 6
- 6a) Mittlere Sporenbreite über 7,8 µm, (oder Sporen über 11 µm lang). 7
- 6b) Mittlere Sporenbreite unter 7,8 µm (Sporenlänge weniger als 10,5 µm):
COPRINUS PLICATILIS VAR.MICROSPORUS Kühner
- 7a) Sporen im Durchschnitt über 11 µm lang 8
- 7b) Sporen im Schnitt unter 11 µm lang:
COPRINUS LEIOCEPHALUS P.D.Orton
- 8a) Mittlere Sporenbreite über 10 µm 9
- 8b) Mittlere Sporenbreite unter 10 µm 10
- 9a) Fruchtkörper klein (Hut +/- 13 mm). Stiel dünner als 1,5 mm:
COPRINUS HERCULES Ulje & Bas
- 9b) Fruchtkörper größer. Stiel 1,5-3 mm dick, "vaak" auf Mist:
COPRINUS LONGIPES Buller
- 10a) Cheilozystiden blasig bis breit flaschenförmig:

COPRINUS PLICATILIS (Curt.ex Fr.) Fr.

10b) Cheilozystiden rund bis elliptisch:

COPRINUS GALERICULIFORMIS (Losa) Watling