

DIE GRUPPE UM TRICHOLOMA CALIGATUM

von Ilkka Kytövuori (1988)

1a) Geruch stark, süßlich, wie *Inocybe corydalina*. Stiel beringt. 2

1b) Geruch anders (z.B. mehlig oder nach Kohlen-Abgasen) oder auch ganz fehlend. Stiel mit oder ohne Ring:

TRICHOLOMA SPEC.

2a) Hut klein (bis 10 cm), fuchsigbraun bis schwärzlich. Eine +/- mediterrane Art:

TRICHOLOMA CALIGATUM

2b) Hut klein bis sehr groß (5-25 cm), +/- bräunlich, mit oder ohne fleischfarbenen Ton. Arten der gemäßigten Zone oder nördliche Arten. 3

3a) Hut groß, robust (bis 25 cm), mit großen angedrückten Schuppen, ohne fleischfarbenen Ton. Sporen über 6,5 µm lang. Bei *Pinus*:

TRICHOLOMA NAUSEOSUM

3b) Hut kleiner (bis 10 cm), mit zahlreichen sehr dünnen, kleinen Schuppen, mit fleischfarbenem Ton. Sporen unter 6 µm lang. Bei *Picea*:

TRICHOLOMA DULCIOLENS