

**ORIENTIERUNGSSCHLÜSSEL FÜR NEUE ALPINE INOCYBEN,  
UNTERGATTUNG INOCYBE, SEKTION INOCYBE (= CORTINATAE)**

von Marcel Bon (1988)  
Roh-Übersetzung: Dobbitsch

1a) Sporen besonders lang, 11-13 µm, oder länglich (Q = 1,8), nur ausgebuchtet. Stiel gänzlich von Fäserchen eingehüllt:

**INOCYBE POLYTRICHI-NORVEGICI**

1b) Sporen weniger lang oder weniger länglich. Stiel im oberen Teil bereift. .... 2

2a) Sporen besonders kurz und weniger länglich (Q = 1,4), nicht höckerig, von vorn gesehen viereckig, oft auch im Profil so:

**INOCYBE TETRAGONOSPORA**

2b) Sporen von vorn gesehen nicht viereckig. .... 3

3a) Ohne spermatischen Geruch (oft etwas säuerlich riechend). Sporen stumpf eckig bis eckig-knotig. Hut auf dem Scheitel dunkel:

**INOCYBE JOHANNAE** und  
**INOCYBE affin. NEOUMBRINA**

3b) Spermatisch riechend ..... 4

4a) Sporen eckig-ausbuchtet:

**INOCYBE STRIAEPES**

4b) Sporen deutlicher knotig. Hutscheitel schmutzig gefärbt:

**INOCYBE HINNULEA**