

**SCHLÜSSEL ZU DEN  
NORDAMERIKANISCHEN (NORD-MEXIKANISCHEN)  
UND EUROPÄISCHEN VARIETÄTEN VON LACCARIA LACCATA**

von Mueller & Vellinga (aus "Persoonia" 1986)  
Übersetzung: Dobbitsch

1a) Stiel sehr lang (meist 70-120 mm). Hut gewölbt, dann niedergedrückt, in der Vertiefung dann oft mit Papille. Basidiosporen fast rund bis breit elliptisch, selten elliptisch ( $Q = (1-)1,05-1,25(-1,6)$ ). In Moosen, einschließlich Sphag-num:

**LACCARIA LACCATA VAR.MOELLERI** Sing.

1b) Stiel kurz bis nicht ganz so lang (meist 17-65 mm). Hut gewölbt bis flach, mitunter niedergedrückt bis gebuckelt, eine Papille fehlt. Basidiosporen rund bis gelegentlich breit elliptisch bis elliptisch. In Moosen oder auch nicht. .... 2

2a) Basidiosporen rund bis fast rund, gelegentlich breit elliptisch ( $Q = 1-1,1(-1,15)$ ):

**LACCARIA LACCATA VAR.PALLIDIFOLIA** (Peck) Peck

2b) Basidiosporen breit elliptisch bis elliptisch ( $Q > 1,2$ ):

**LACCARIA LACCATA VAR.LACCATA**