

HILFSSCHLÜSSEL DUNGBEWOHNENDE SAMT-TINTLINGE

von F.Gröger (aus "Mykol.Mitteilungsblatt" 1992/2)

1a) Mit wenigen (12-20) durchgehenden Lamellen. Hut geschlossen bis maximal 10 mm hoch, oft deutlich kleiner bleibend. 2

1b) Mit mehr als 20(-35) durchgehenden Lamellen. Fruchtkörper geschlossen bis zu 16-20 mm hoch. 5

2a) Hut mit körnig-flockigem Velum:
COPRINUS HEPTEMERUS

2b) Hut nur fein flaumig. Ohne Velumelemente. 3

3a) Reifende Lamellen mit kleinen hellen Flecken unter einer starken Lupe (Flächenzystiden!). Hut bis 10 mm hoch, ausgebreitet bis 18 mm im Durchmesser:
COPRINUS STELLATUS

3b) Reifende Lamellen auch unter einer starken Lupe +/- gleichmäßig gefärbt (ohne Pleurozystiden). Hut bis 5 mm hoch, ausgebreitet bis 7 mm. 4

4a) Hut jung ockerbraun, gelbbraun (graubraun):
COPRINUS PELLUCIDUS
COPRINUS HETEROSETULOSUS

4b) Hut jung umbrabraun, dattelbraun:
COPRINUS CURTUS

5a) Hut jung in der Mitte rotbraun, purpurbraun. 6

5b) Hut jung heller: creme, ockerbraun, zimtbraun, immer ohne Sphaerocysten:
COPRINUS BISPORUS
COPRINUS EPHEMERUS
COPRINUS CONGREGATUS

6a) Hut mit Sphaerocysten bedeckt (starke Lupe, besser: Mikroskop):
COPRINUS MARCULENTUS

6b) Hut ohne Sphaerocysten. Zweisporige Art:
COPRINUS SASSII