



Agaricus xanthoderma
Veränderlicher Karbol-Egerling
Agaric jaunissant
Prataiolo a odore di inchiostro

<p>1. Hutform kugelig, glockig, Mitte abgeflacht</p> <p>2. Hutfarbe kalkweiss, Rand nach Verletzung sofort gilbend, Flecken schmutzig braun werdend</p> <p>3. Hutoberfläche wie Kalkbelag, glatt</p> <p>4. Fleisch weiss, im Schnitt gelb anlaufend, besonders in der Stielbasis</p> <p>5. Lamellenfarbe zuerst rötlich, dann schokoladebraun, schwarz</p> <p>6. Lamellenhaltung frei, schmal, gedrängt</p> <p>7. Sporenfarbe purpurbraun</p> <p>8. Stiel und Stielmerkmale weiss, kahl, Basis verletzt sofort gelb anlaufend, bräunlich gezähnte Manschette nach oben abziehbar, Basis knollig</p> <p>9. Geruch geruchlos oder schwach nach Karbol oder Tinte, beim Kochen stark nach Tinte</p> <p>10. Geschmack widerlich</p> <p>Vorkommen in Wiesen, Parkanlagen oder im Wald</p>	<p>1. Forme du chapeau hémisphérique, campanulé, aplani au centre</p> <p>2. Couleur du chapeau blanche, marge jaunissant au froissement, puis se tachant de brun sale</p> <p>3. Cuticule mate, blanche, lisse</p> <p>4. Chair blanche, jaunissant au frottement, surtout à la base du pied</p> <p>5. Couleur des lames au début rosâtre, puis brun chocolat et enfin noire</p> <p>6. Caractéristiques des lames libres, étroites, serrées</p> <p>7. Couleur de la sporée brun pourpre foncé</p> <p>8. Caractéristiques du pied blanc, lisse, jaunissant surtout à la base au toucher, anneau, pendant, à roue dentée brunâtre, base bulbouse</p> <p>9. Odeur nulle ou faible de phénol ou d'encre, se renforçant à la cuisson</p> <p>10. Saveur écoeurante</p> <p>Habitat dans les prés, les parcs, les forêts, tendance rudérale</p>	<p>1. Forma del cappello sferico, campanulato, spianato al centro</p> <p>2. Colore del cappello bianco-calce, al margine subito virante al giallo alla frattura, le macchie imbruniscono</p> <p>3. Cuticola come rivestita di calce, liscia</p> <p>4. Carne bianca, al taglio vira al giallo, specialmente alla base del gambo</p> <p>5. Colore delle lamelle dapprima rossastre, bruno cioccolato, nero poi</p> <p>6. Caratteristiche delle lamelle libere, strette, fitte</p> <p>7. Sporata bruno-purpurea</p> <p>8. Caratteristiche del gambo bianco, liscio, base alla frattura subito virante al giallo, anello brunastro pendulo dentellato, base bulbosa</p> <p>9. Odore inodore oppure leggero di fenolo o inchiostro, alla cottura intenso di inchiostro</p> <p>10. Sapore ripugnante</p> <p>Habitat nei prati, parchi o nel bosco</p>
---	--	--