


Massstab 2000:1 (20 mm = 10 µm)



Massstab in cm



Amanita verna
Frühlings-Knollenblätterpilz
Amanite printanière
Tignosa primaverile

1. Hutform
jung glockig gewölbt, alt ausgebreitet

2. Hutfarbe
weiss, bisweilen Scheitel gelblich

3. Hutoberfläche
seidig, glatt, fettig glänzend

4. Fleisch
weiss

5. Lamellenfarbe
weiss

6. Lamellenhaltung
frei, gedrängt

7. Sporenfarbe
weiss

8. Stiel und Stielmerkmale
weiss, mit geriefter Manschette, Basis knollig mit lappiger Scheide

9. Geruch
süsslich, unangenehm

10. Geschmack
mild

Vorkommen
Frühling bis Herbst in Laubwäldern, vor allem auf Kalk

1. Forme du chapeau
campanulé pulviné dans la jeunesse, étalé avec l'âge

2. Couleur du chapeau
blanc, disque parfois jaunâtre

3. Cuticule
soyeuse, lisse, lardacée brillante

4. Chair
blanche

5. Couleur des lames
blanche

6. Forme des lames
libres, serrées

7. Couleur de la sporée
blanche

8. Caractéristiques du pied
blanc, anneau strié, base bulbouse, volve lobée, membraneuse blanche

9. Odeur
douceâtre, désagréable

10. Saveur
douce

Habitat
du printemps à l'automne, sous feuillus, de préférence sur sol calcaire

1. Forma del cappello
giovane emisferico convesso, in seguito appianato

2. Colore del cappello
bianco, disco talvolta giallognolo

3. Cuticola
sericea, liscia, unta, brillante

4. Carne
bianca

5. Colore delle lamelle
bianche

6. Caratteristiche delle lamelle
libere, fitte

7. Sporata
bianca

8. Caratteristiche del gambo
bianco, anello striato, base bulbosa con volva bianca membranosa

9. Odore
dolciastro, sgradevole

10. Sapore
mite

Habitat
dalla primavera all'autunno in boschi di latifoglie, specialmente in terreno calcareo