



Boletus radicans

Wurzelnder Bitter-Röhrling

Bolet radicant

Boleto biancastro

1. Hutform
jung halbkugelig, später unregelmässig ausgebreitet, derb, dickfleischig, Huthaut bis 3 mm überstehend

2. Hutfarbe
weisslich bis hell beige-grau, Druckstellen zuerst schwach grünblau, dann bräunlich

3. Hutoberfläche
trocken, unregelmässig grubig, fein filzig

4. Fleisch
blass gelblich, im Schnitt Scheitel sofort blauend, danach wieder ausblassend

5. Röhrenfarbe
leuchtend gelb, später oliv- bis bräunlich-gelb, auf Druck meist blauend, Mündungen gelb

6. Röhrenhaltung
ausgebuchtet bis fast frei

7. Sporenfarbe
olivbraun

8. Stiel und Stielmerkmale
knollig bauchig, Basis spitz bis wurzelnd, jung hellgelb mit gelblichem bis bräunlichem Netz, unterhalb bisweilen schwach rot gezont, Fleisch in der Stielbasis rosabräunlich und nicht blauend, fest

9. Geruch
eher unangenehm, schwach nach Maggi und Tinte

10. Geschmack
bitter, teils erst nach längerem Kauen

Vorkommen
bei Laubbäumen, oft in Parkanlagen, gerne auf verdichteten Böden

1. Forme du chapeau
d'abord hémisphérique, puis irrégulièrement pulviné, ferme, charnu; cuticule débordante jusqu'à 3mm

2. Couleur du chapeau
blanchâtre à gris beige pâle, se tachant légèrement de bleu vert au toucher, puis de brunâtre

3. Cuticule
sèche, irrégulièrement scrobiculée, finement feutrée

4. Chair
jaune pâle, bleuissant immédiatement à la coupe, mais pâlissant ensuite à nouveau

5. Couleur des tubes
tubes et pores jaune vif, puis olive à jaune brunâtre, bleuissant au toucher

6. Caractéristiques des tubes
déprimés autour du pied à presque libres

7. Couleur de la sporée
brun olive

8. Caractéristiques du pied
bulbeux puis clavé, base amincie à radicante, jaune pâle avec un réseau jaunâtre puis devenant brunâtre avec l'âge, parfois faiblement zoné de rouge; chair ferme à la base du pied, rose brunâtre et non bleuissante

9. Odeur
faible, plutôt désagréable, de Maggi et d'encre

10. Saveur
amère, souvent après mastication prolongée

Habitat
Sous feuillus, souvent dans les parcs, de préférence sur sol compacts

1. Forma del cappello
emisferico da giovane, irregolarmente appianato poi, sodo, carnoso, cuticola eccedente fino a 3 mm

2. Colore del cappello
da biancastro a grigio-beige chiaro, al tocco dapprima debolmente blu-verde, poi brunastro

3. Cuticola
asciutta, irregolarmente screpolata, finemente fettata

4. Carne
giallognola chiaro, al taglio subito virante al blu, poi nuovamente pallidescente

5. Colore dei tubuli
giallo lucente, oliva fino a giallo-brunastro poi, virante al blu al tocco, pori gialli

6. Caratteristiche dei tubuli
smarginati fino a quasi liberi

7. Sporata
bruno-oliva

8. Caratteristiche del gambo
ventricoso, base da appuntita a radicante, da giovane giallo chiaro con reticolo da giallastro a brunastro, sotto spesso con leggera zonatura rossa, carne alla base del gambo rosa brunastra e non virante al blu, sodo

9. Odore
piuttosto sgradevole, debolmente di brodo Maggi e inchiostro

10. Sapore
amaro, talvolta solo dopo prolungata masticatura

Habitat
Sotto latifoglie, spesso nei parchi e terreni compattati