



Massstab 2000:1 (20 mm = 10 µm)



Massstab in cm



Inocybe fibrosa Weisser Risspilz Inocybe à marge infractée

1. Hutform
erst kegelig, dann ausgebreitet und breit gebuckelt, Rand erst eingebogen, dann ausgebreitet und breit eingeknickt

2. Hutfarbe
elfenbeinweiss, rohweisslich bis blass semmelfarben

3. Hutoberfläche
jung seidig, später radial einreissend

4. Fleisch
weiss, derb, im Stiel grobfaserig

5. Lamellenfarbe
jung grauweisslich, cremeweisslich, alt graubräunlich

6. Lamellenhaltung
ausgerandet, etwa halb angewachsen, eher entfernt

7. Sporenfarbe
dunkelbräunlich

8. Stiel und Stielmerkmale
weisslich, im oberen Teil stark bereift, zylindrisch, gegen die Basis angeschwollen bis leicht knollig

9. Geruch
leicht spermatisch

10. Geschmack
mild, uncharakteristisch

Vorkommen
vor allem im montanen Nadelwald auf Kalk, aber auch in Auenwäldern

1. Forme du chapeau
d'abord conique, puis étalé avec un large mamelon, marge d'abord infléchie, puis s'étalant mais largement infractée

2. Couleur du chapeau
blanc d'ivoire, blanchâtre à crème pâle

3. Cuticule
d'abord soyeuse, puis se fissurant radialement

4. Chair
blanche, ferme, fibreuse dans le pied

5. Couleur des lames
d'abord gris blanchâtre à crème blanchâtre, puis gris brunâtre

6. Forme des lames
émarginées, adnées sur leur moitié, plutôt espacées

7. Couleur de la sporée
brunâtre foncé

8. Caractéristiques du pied
blanchâtre, fortement pruineux au sommet, cylindrique, base renflée à bulbilleuse

9. Odeur
un peu spermatische

10. Saveur
douce, non typique

Habitat
surtout en forêts montagnardes de conifères et sur terrain calcaire, mais aussi en forêts riveraines

1. Forma del cappello
dapprima conico poi appianato e largamente umbonato, margine dapprima involuto poi espanso e largamente ripiegato

2. Colore del cappello
bianco avorio, da biancastro a color pane pallido

3. Cuticola
da giovane sericea, poi fissurata radialmente

4. Carne
bianca, soda, nel gambo grossolanamente fibrosa

5. Colore delle lamelle
giovani grigio biancastre, crema biancastro, poi grigio brunastro

6. Caratteristiche delle lamelle
uncinate, circa semi adnate, piuttosto distanti

7. Sporata
bruno scuro

8. Caratteristiche del gambo
biancastro, molto pruinoso all'apice, cilindrico, verso la base da rigonfio a leggermente bulboso

9. Odore
leggermente spermatico

10. Sapore
mite, non caratteristico

Habitat
specialmente in boschi montani di conifere su terreno calcareo, ma pure in boschi golenali